

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
<b>Dokumentum címe:</b>	<b>Mióma göb kiagyazása (göb=jóindulatú csomós méhizom daganat)</b>		
<b>Változat: 03</b>	<b>Hatályos: 2017.05.22.</b>	<b>1.oldal a(z) 3 oldalból</b>	<b>Módosítás 2</b>
<b>Dokumentum száma: Bny./SzN./21</b>	<b>Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos</b>		

Beteg neve: ..... TAJ száma: .....

### Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében mióma göb kiagyazása beavatkozás válik szükségessé. A Siófoki Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

#### A beavatkozás jellege:

A mióma göbök elhelyezkedhetnek a méhtest falában, a méh hashártyaborítéka alatt, a méh nyálkahártya alatt, a méhnyak állományában és a méhet tartó szalagok, lemezek között. Elhelyezkedésüktől függően okozhatnak rendellenes vérzést, fájdalmat, környező szervekre nyomási tüneteket – így gyakori székelési, vizelési inger -, húgyvezető és a vesék vizenyős felduzzadását, sterilitást és a spontán vetélések gyakoriságát is növelhetik. A kezelést több tényező befolyásolja: a daganat mérete, növekedési üteme, a panaszok, a beteg életkora, kíván-e még terhességet. A műtétet a has megnyitásával végezzük.

**Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul)**.....

**A beavatkozás tervezett időpontja:** .....

#### A beavatkozás célja:

A panaszokat okozó, nagy (legalább ökölnyi) vagy növekedési tendenciát mutató göbök eltávolítása mindenképpen szükséges. Ha a beteg a későbbiekben még szeretne terhességet, feltétlenül meg kell kísérelni a szervmegtartó műtétet. A méhnyak állományából kiinduló, a méhet tartó lemezek között elhelyezkedő göbök miatt gyakran kényszerülünk a méh teljes eltávolítására, hiszen ezen esetekben a méh ereinek anatómiai megváltozása, a húgyvezető lefutásának módosulása nagy vérzéshez, a húgyvezető lefogásához vezethetnek. Nagy fontossággal bír a műtét előtti kivizsgálás (UH, tapintásos vizsgálat, méhüri tükrözés, stb.)

#### Hogyan történik a beavatkozás?

A beavatkozás az altatóorvos által javasolt érzéstelenítési módban a megfelelő műtéti előkészítést követően a várható elváltozás jellegének és az Ön adottságainak megfelelően vagy alhasi középmetszést, vagy a szeméremcsont feletti redőben harántmetszést („bikini” metszést) ejtve nyitjuk meg a hasát. A műtétet a menstruáció utáni napokra időzítjük, ilyenkor kisebb a vérveszteség és elkerülhető a fel nem ismert koraterhesség lehetősége is.

A műtét során ellenőrizzük a mióma göcök helyzetét, nagyságát, a függelékek állapotát, hiszen a petefészekben talált daganat, gyulladás vagy a várnál több és kedvezőtlenebb helyzetű mióma göb meghiúsíthatja a tervezett szervmegtartó műtétet.

#### Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik különféle társbetegségek, (cukorbetegség) élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát.

Leggyakoribb szövődmény az erős vérzés a műtét alatt és gondos figyelmet igényel a műtét utáni utóvérzés lehetősége is, amely azonnali ismételt hasi feltárást tehet szükségessé. Műtét alatt előfordulhat hasi szervek (húgyhólyag, húgyvezeték, bél) sérülése, melyek ellátása azonnal, még a műtét alatt megtörténik. Műtét közben kialakulhat olyan erős vérzés, mely miatt vérkészítmény adására is kényszerülhetünk. Fertőzések, sebgyógyulás, vérszegénység, tartósabb ágyhoz kötöttség esetén tüdőgyulladás, esetleg vérrögösödés is előfordulhat.

**Mióma göb kiagyazáson átesett betegek későbbi terhessége során a szülési fájások hatására hegsváltság jöhet létre, ezért az ilyen esetekben indokolt lehet a megelőző császármetszés elvégzése.**

<b>Betegtájékoztató és beleegyező lap</b>			
<b>Dokumentum címe:</b>	<b>Mióma göb kiagyazása (göb=jóindulatú csomós méhizom daganat)</b>		
<b>Változat: 03</b>	<b>Hatályos: 2017.05.22.</b>	<b>2.oldal a(z) 3 oldalból</b>	<b>Módosítás 2</b>
<b>Dokumentum száma: Bny./SzN./21</b>	<b>Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos</b>		

#### **Műtét utáni történések:**

A beteg 24 órás szubintenzív megfigyelése. Műtét után őrző szobába kerül, ahol műszerekkel vér –és vizeletvizsgálatokkal követjük állapotát. Állandó vénatűjén keresztül folyadékpótlásban és gyógyszerek adásában részesül. Vizeletét minimum 24 órán át katéteren át vezetjük le. Inni csak éber állapotban kap, enni pedig csak a kellőképpen beindult bélműködés után. A műtét után belei renyhébben működnek, ha gyógyszerekre nem reagálnak nagyon ritkán el is záródhatnak, mely miatt esetleges korrekciós műtetre is szükség lehet.

Műtét után felléphet lázas állapot, amelyet gyógyszerekkel csillapítunk.  
Panaszmentesség esetén a hetedik napon otthonába bocsátjuk.

#### **Várható következmények:**

Eleinte hasi fájdalmak lesznek, melyeket csillapítunk. Idővel ezek enyhülnek, szűnnek. Kisebb-nagyobb letapadások alakulhatnak ki a hasában, melyek időszakos fájdalommal, frontérzékenységgel járhatnak. A meddőségének háttérben meghúzódó mióma göb eltávolítása után sikeres terhesség jöhet létre.

#### **Milyen alternatív megoldás lehetséges?**

Kisebb, a méhnyálkahártya alatt elhelyezkedő göböket a hüvelyen keresztül méhúri tükrözés segítségével, és a technika fejlődése során egyre többször előtérbe kerülhet a köldökgyűrűn keresztül laparoszko-pos (hasi tükrözéses eljárással) történő eltávolítása a göbnek.

Vannak olyan gyógyszerek, amelyeket körülbelül hat héten át adva jelentősen megkisebbitthetik a gócot, a kisebbek esetleg vissza is fejlődhetnek, de ez a módszer azonban átmeneti megoldást jelent, mert a terápia abbahagyása után visszaállhat az eredeti állapot.

#### **Mi a teendő a beavatkozás után?**

Műtétet követően 6 hétig kímélő életmód, ülőfürdő és nemi élet mellőzése javasolt. 2 hét múlva osztályunkon a szövettani leletért zárójelentésével jelentkezzen.

6 hét múlva kontroll vizsgálaton jelentkezzen, panasz esetén azonnal.

#### **Műtét elmaradásának következményei:**

Műtét elmaradásának következményeként fennálló panaszai tovább fokozódhatnak, további egészségromlás következhet be, teherbe esésének esélye csökken.

#### **Beleegyező nyilatkozat**

A mióma göb kiagyazása műtėti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....  
a felvilágosítást végző személy

.....  
beteg/törvényes képviselő aláírása

Siófok, ..... év..... hó.....nap..... óra..... perc

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Mióma göb kiagyazása (göb=jóindulatú csomós méhizom daganat)		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	3.oldal a(z) 3 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./21	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

### Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....  
 a felvilágosítást végző személy

.....  
 beteg/törvényes képviselő aláírása

1.Tanú:.....  
 aláírás

2.Tanú:.....  
 aláírás

Siófok, ..... év..... hó.....nap..... óra..... perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!